

Flóra_R

Erős növekedésű. Érési idő: szeptember második fele. Bőtermő, lugasművelésre rendkívül alkalmas. Betegség ellenállás peronoszpórára és lisztharmatra közepesen fogékony, csapadékos években közepesen rothadékony. Fagytűrése -19°C. Fürt átlag 394 g, ágas, közepesen laza; bogyó átlag 4,3 g, megnyúlt, enyhén hamvas, lédús, ropogós, kemény bőrű, semleges ízű, magja kicsi, nem zavaró. Kedvezőtlen évjáratban bogyói nem egyformán színeződnek.



Ruby King_MN

Erős növekedésű, termékeny fajta. Érési idő: szeptember közepe. Betegség ellenállás átlagos. Teljes körű gondos növényvédelmet igényel, lisztharmatra közepesen érzékeny, esős években rothadásra hajlamos a fürt tömörsége miatt. Fagytűrése -16-18°C.

Fürt 600-900 g, kúpos, közepesen laza, olykor kissé tömött; bogyó magnélküli, kerek, vagy kissé ovális, 4-7 g, bordó, vagy kékes-lila színű, húsos, ropogós, héja erős, íze harmonikus. A bogyó ellenáll a repedésnek.



Jupiter Rea_MN

Növekedési erélye nagy. Érési idő: szeptember közepe-vége. Betegség ellenállás: átlagos. Talajjal szemben nem támaszt nagy igényeket, nagy hőigényű növény, a fagyok károsíthatják. Fagytűrése -17°C.

Fürt 420-1300 g, kúpos, közepesen szárnyas, egyenletesen sűrű; bogyó 6 g, vörös színű. Magnélküli, íze semleges.



Klára

Közepesen erős növekedésű, stabil, megbízható fajta. Érési idő: augusztus eleje-közepe. Betegség ellenállása valamivel az átlag felett. Fagytűrése -21°C.

Fürt 400-500 g, kúpos, vállas, közepesen tömött; bogyó ovális, 5-7 g, fényes sárga, húsa húsos, lédús, ropogós, harmonikus ízű, héja vékony.



Guzal Kara

Erős növekedésű. Érési idő: szeptember második fele. Betegség ellenállás átlagos, lisztharmatra érzékeny. Fagytűrése -18-19°C.

Fürt 300-500 g, kúpos vagy hengeres; bogyó 6-8 g, kék-fekete, hamvas (pruinom bevonat). Húsa lédús, ropogós kellemes frissítő ízű. 2-3 nagy magot tartalmaz.



Conegliano

Közepesen erős növekedésű. Érési idő: augusztus eleje. Betegség ellenállás átlagos. Fagytűrése -18°C.

Fürt 300-450 g, vállas, vagy hengeres, olykor kissé tömött; bogyó kerek, vagy kissé ovális, átlag 5,5 g, kék színű, vékony héjú, lédús, kellemes aromás.



Fanny

Erős növekedésű, jó termő. Érési idő: augusztus vége-szeptember eleje. Betegség ellenállás peronoszpórának jól, lisztharmatnak közepesen ellenáll, nem vagy alig rothad. Fagytűrése -19°C.

Fürt átlag 437 g, ágas, laza; bogyó 5,5 g, kissé hamvas, olykor üveges, fehéres, sárgás-rózsaszín, héja szívós szövetű, húsa kemény, roppanó. Íze semleges, magja nem zavaró.



Anna

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus vége-szeptember eleje. Bőtermő, virágzata jól termékenyül. Betegség ellenállás átlagos, lisztharmatra, orbáncra érzékeny, szürkerothadásnak jól ellenáll, gondos növényvédelmet igényel. Fagytűrése -18-19°C.

Fürt 550 g, vállas, ágas, közepesen laza; bogyó 6,6 g, sárgás-zöld, héja vékony, olvadó, ropogós, aromás ízvilágú, magja nagy, kissé zavaró. Bogyója nem reped.



Árkádia

Közepesen erős növekedés. Érési idő: augusztus. Betegség ellenállás átlag felett, lisztharmatra kissé érzékeny. Fagytűrése -21°C.

Fürt 500- 700 g, vagy több, kúpos, laza; bogyó 6- 8 g, fényes, fehéres sárga, íze harmonikus.



Belgrádi magvatlan_MN

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus vége-szeptember eleje. Termékenysége magas, betegség ellenállás átlagos, peronoszpórára érzékeny. Fagytűrése -17-20°C.

Fürt 450-700 g, hengeres és ágas, laza; bogyó 3-4 g, ovális, magnélküli, fényes zöld-sárga, ropogós, lédús, kissé muskotályos.



Bolgár Rezi_R

Átlagos növekedésű. Érési idő: augusztus második fele. Magas termékenységgű, betegség ellenállás magas. Rezisztens. Fagytűrése -22-24°C.

Fürt 500-700 g, kúpos, vagy hengeres, kissé tömött; bogyó 10-14 g, fényes fehér-sárga. Íze egyszerű, húsos, kissé ropogós.



Eszter_R

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus eleje. Bőtermő, gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenáll, kevésbé rothad. Fagytűrése -24°C.

Fürt átlag 335 g, vállas, kissé tömött, középnagy-nagy; bogyó 3,7 g gömbölyű, nagy kék, hamvas, nem mintázott; íze semleges, héja vékony, aránylag olvadó.



Helikon szépe_MN

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus eleje-közepe. Betegség ellenállás átlagos. Fagyűrőse -19°C.

Fürt 400-500 g, hengeres vagy kúpos, közepesen laza; bogyó 4-6 g, arany Sárga, ropogós, enyhén muskotályos ízű. Magnélküli (puhamagvú).



Rizomat

Erős növekedésű. Érési idő: szeptember közepe. Betegség ellenállás átlagos, esős években a bogyó kirepedhet és szürkerothadásra hajlamos. Fagyűrőse -19°C.

Fürt 500-800 g, de akár 2-3 kg is lehet. A fürt kúpos, vagy hengeres, laza szerkezetű; bogyó 10-16 g, rózsaszín, bőre kissé viaszos, ropogós, íze harmonikus. Néha kis puha magokkal rendelkezik.



Moldova_R

Középerős növekedésű. Érési idő: október közepe. Betegség ellenállás magas, rezisztens. Fagyűrőse -23°C.

Fürt 350-500 g, kúpos, hengeres, közepesen laza; bogyó 5-7 g, sötétkék, lédús, ropogós, semleges ízű.



Suvenir

Középerős növekedésű. Érési idő: szeptember eleje. Talajjal szemben jól alkalmazkodik. Fagyűrőse -18°C

Fürt 250-300 g kúpos, kissé vállas és hosszú, közepesen tömött; bogyó 6-8 gramm, sötétkék színűek, a héj hamvas bevonatú, kellemes ízvilágú, édes, muskotályos íz jellemző.



Dunav

Erős növekedésű. Érési idő: szeptember eleje. Talaj és fekvés iránt nem igényes, betegség ellenállás valamivel az átlag felett. Fagytűrése -18-19°C.

Fürt 600-800 g, kúpos laza; bogyó 7-10 g, sötét piros, ill. kékes-lila, ropogós harmonikus ízű.



Éva

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus második fele. Bőtermő, betegség ellenállás átlagos, nem rothadó. Fagytűrése -18-20°C.


Fürt 400 g, de akár 2 kg is lehet, kúpos vagy hengeres; bogyó 6,5 g, ovális, világos sárga, enyhén hamvas, vékony héjú, ropogós, semleges ízű, magja alig érezhető.



Melinda

Közepesen erős növekedésű. Érési idő: augusztus vége-szeptember eleje. Betegség ellenállása átlagos, bogyója csak túlérve, vagy esős időben rothad. Fagytűrése -19°C.

Fürt 430 g, vállas, közepesen laza; bogyó 6,2 g, sötétkék, erősen hamvas, héja vékony, ropogós, semleges ízű, magja alig érezhető.



Kismis Moldavszkij_MN

Erős növekedésű. Érési idő: szeptember második fele-október eleje. Lugasnak is alkalmas, betegség ellenállás átlagos, szürke rothadásra esősebb években hajlamos. Fagytűrése -18°C.

Fürt 500-800 g, ágas, átlagosan tömött; bogyó 4-6 g, kerek, vagy kissé ovális, lilás-sötét piros színű, gyengén hamvas. Hátránya, hogy a bogyók nem egyformán színeződnek. Harmonikus ízű. Magnélküli, illetve csökevényes magvú.



Afuz Ali

Erőteljes növekedésű. Érési idő: szeptember vége-október eleje. Fekvés és talaj iránt igényes, fagyérzékeny, viszonylag szárazságtűrő, kevésbé rothadó, peronoszpórára és lisztharmatra érzékeny. Fagytűrése -18°C.

Fürt 400-800 g, közepesen laza; bogyó 8-10 g, sárga színű, húsa lédús, semleges ízű.



Hamburgi muskotály

Közepesen erős a növekedési. Érési idő: szeptember vége-október eleje. Meleg fekvést igényel, talajban nem válogat, egyenetlenül ér, rothadásra mérsékelten hajlamos. Fagytűrése -20°C.

Fürt 220 g, ágas, gyakran laza, középnagy; bogyó 220 g, megnyúlt, nagy, feltűnően hamvas, húsa ropogós, íze muskotályos, héja vékony.



Néro_R

Erőteljes növekedésű. Érési idő: augusztus közepe-vége. Betegség ellenállás, peronoszpórára és lisztharmatra kevésbé érzékeny, esős évjáratokban bogyói rothadnak. Fagytűrése -25°C.

Fürt 200 g, kúpos, szárnyas, közepesen laza; bogyó 3,2 g, szabálytalan tojás alakú, színe sötétkék, hamvas, vékony héjú, lédús, íze egyszerű, magja nagy, ami zavaró lehet.



Pölöskei Muskotály_R

Erős növekedésű. Érési idő: szeptember közepe-vége. Betegség ellenállás lomb-és fürtreiszstens, szárazabb években permetezés nélkül is termesztethető. Fagyérzékeny, ezért védett meleg fekvésű helyre telepítsük, lugasművelésre is alkalmas fajta.

Fürt 420 g, ágas, vállas, laza, fürtkocsány hosszú, zöld; bogyó 4,1 g, sárgás-zöld, kissé hamvas, héja kissé rágós, húsa édes, ropogós, muskotályos ízű, magja alig érezhető.



Cardinál

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus közepe. Talaj iránt nem, fekvés iránt igényes, a szárazságot elviseli, gombás megbetegedésekre és bogyórepedésre hajlamos, rothadásra érzéken. Fagytűrése -18°C.

Fürt 400-600 g, ágas, laza; bogyó kerek, kékes-vörös, vastag, de olvadó héjú, húsos, ropogós, lészegény textúra, semleges ízű.



Chasselas

Középerős növekedésű. Érési idő: szeptember eleje. Talaj iránt igényes, fekvés iránt viszont nem, kevésbé rothad, viszonylag szárazságtűrő, fagytűrő, peronoszpórára igen, lisztharmatra kevésbé érzékeny.

Fürt 140 g, vállas, tömött, középnagy; bogyó 3,2 g gömbölyű, középnagy, pontozott, kissé hamvas, húsa ropogós, lédús, húsos, íze közömbös.



Pannónia Kincse

Középerős növekedésű. Érési idő: augusztus közepe. Bőtermő, talajra kevésbé, fekvésre érzékeny, mérsékelten fagytűrő, a szárazságot elviseli, peronoszpórára, lisztharmatra érzékeny. Fagytűrése -18°C.

Fürt 260 g, ágas vagy vállas, laza; bogyó 5,3 g, megnyúlt, nagy, féhéressárga, gyéren pontozott, alig hamvas, húsa ropogós, húsos, íze közömbös.



Palatina_R

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus közepe-vége. Bőtermő, talaj és fekvés iránt nem igényes, gombás megbetegedéseknek közepesen áll ellen, kevésbé rothad. Fagytűrése -24°C.

Fürt 300-500 g, vállas, középnagy, laza; bogyó 3,5-5 gr, megnyúlt, középnagy, zöldessárga, pontozott, hamvas, húsa húsos, ropogós, íze muskotályos.



Favorit

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus második fele. Betegség ellenállása átlagos, lisztharmatra érzékeny, túlérésben bogyói kissé rothadnak. Fagytűrése -19°C.

Fürt 200 g, hengeres, vállas, néha szárnyas, közepesen tömött; bogyó 4,3 g, fényes zöld-sárga, ropogós, lédús, íze harmonikus, enyhén fűszeres, kevés magvú, magja középnagy.



Csaba Gyöngye

Középerős növekedésű. Érési idő: július közepe-vége. Sok másodtermést hoz, ami mindig be is érlik, esős években bogyója rothadásra hajlamos. Betegség-ellenállás átlagos. Fagytűrése -20°C.

Fürt 120-150 g, kúpos laza; bogyó 2-3 g, zöldes-sárga, világos sárga, lédús, muskotályos ízű.



Angéla_R

Közepesen erős, vagy erős növekedésű. Érési idő: szeptember vége-október eleje. Lugas művelésre alkalmas. Betegség ellenállása magas, rezisztens, szürke rothadásra nem hajlamos. Fagytűrése -19 -21°C.

Fürt 450-530 g, vállas, közepesen laza; bogyó 5,1 g, ovális, sárgás-fehér színű, hamvas, héja közepesen vastag, lédús, ropogós, semleges ízű. Magja nem zavaró.



Irsai Olivér

Az egyik legértékesebb muskotályfajtánk, kifejezetten megbízható, bőven termő fajta. Növekedése átlagos. Érési idő: augusztus közepe-szeptember első fele. Nehezen rothad. Fürt közepesen nagyméretűek 150-170 g, vállasok, lazák; bogyója kerek, kissé hamvas, éretten sárgás, terméshéja közepesen vastag. Édes és lédús, muskotályos jellegű.



Izabella_R

Közepes hozamú fajta. Érési idő: szeptember közepe. Betegség ellenállás magas, rezisztens. Fagytűrése -25 °C.

Fürt 150- 200 g, közepesen tömött, kissé megnyúltak; bogyó 3- 5 g, fekete, labrusca ízű.



Narancsízű

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus közepe. Bőtermő, rügyei termékenyek, bogyója nem pereg, nem rothad. Betegség ellenállás átlagos, lisztharmatra érzékeny. Fagytűrése: -19 °C.

Fürt átlag 308 g, kissé vállas, ágas, kissé tömött; bogyó 4,7 g, sárga, kissé hamvas, pontozott, héja vékony, kissé rágós, magja kicsi.



Sarolta

Erős növekedésű. Érési idő: augusztus vége. Betegség ellenállás átlag felett, de lisztharmatra érzékeny. Fagytűrése -20°-22 °C

Fürt Közepesen laza, átlag 420 g; bogyó 7,1 g, világos sárga, kissé hamvas, héja vékony, de erős, húsa ropogós, magja kicsi, nem zavaró.



Szőlőskertek királynője

Közepes növekedésű. Érési idő: augusztus vége. Esős években bogyója repedésre és rothadásra hajlamos. Másodfürtre hajlamos. Fagytűrése -18 °C

Fürt 200- 240 g, kúpos, vagy vállas, közepesen tömött; bogyó 4,1 g, kissé ovális, borostyán-sárga színű, kissé hamvas, muskotályos ízű.



Teréz_R

Erős növekedésű. Érési idő: szeptember közepe-október eleje. Rügye termékeny, bőtermő. Betegség ellenállás magas, rezisztens. Fagytűrése: -24°C
Fürt átlag 461 g, hosszú, ágas, laza; bogyó 5.6 g, ovális, zöldes-sárga, éretten napos oldalon pirkadt színű, héja közepesen vastag, rágós, húsa ropogós, lédús, semleges ízű.



Viktória

Középerős vagy erős növekedésű. Érési idő: augusztus közepe. Betegség ellenállása átlagos. Fagytűrése -20 °C
Fürt 700-900 g, kúpos, laza; bogyó 8-10 g, világos sárga, húsos, lédús, ropogós, harmonikus ízű.



Vostorg

Középerős vagy erős növekedésű. Érési idő: augusztus közepe. Betegség ellenállás átlag felett. Fagytűrése: -25°C
Fürt 500-700 g, kúpos, laza; bogyó 6-7 g, világos sárga, napos oldalon sötétebb pírral, húsa lédús, ropogós.



R: *Rezisztens*

MN: *Magnélküli*